

Traumatisme du genou

droit gauche

Identité

Etiquette patient

- ♂ profession :
 ♀ sportif prof.
 ado sportif amateur
 enf. âge : droitier gaucher
 date accident : h
 date 1^{re} consultation : h
 autre consultation : h

D^r

Antécédents généraux (maladies osseuses, neurologiques, musculaires ; anticoagulation, crase sanguine ; tumeur, diabète, allergie, alcool, médicaments)

Antécédents locaux (anciens traumatismes, autres pathologies, troubles statiques)

Circonstances

- Voie publique
 Professionnel
 Domestique
 Jeu
 Sport
 Autre
 Malaise

Mécanisme

- énergie** basse moyenne haute
 choc direct indirect axial valg. var. fl. ext. rot. ext. rot. int.
 passage accroupi – debout inv. cheville évers. cheville

Symptômes

- douleur** discrète modérée intense diffuse
 localisée à :
 impotence partielle totale
 craquement lâchage accrochage blocage impression de luxation externe

Status

- Hanche** intégrité pathologique **Cheville** intégrité pathologique
- Déformation** absence évoquant lux. genou ant. post. fract.-lux. lux. rotule
 défaut d'ext. irréductible de ____° effacement de la tubérosité tibiale antérieure
- Peau** plaie localisée à:
 hématome localisé à:
- Art. poplitée** palp. non palp. artère péd. palp. non palp.
 art. tib. post. palp. non palp. pouls capillaire < 2 sec. > 2 sec.
- Sensibilité** intacte diminuée abolie
- Mobilité** active ext. flex. (0-130):
 passive ext. flex. (0-130):
- Epanchement** absence discret important cc; couleur: lobules graisseux
- Palpation douloureuse** condyle int. condyle ext. rotule mob. rotule plateau tib. int.
 insert. fém. LLI insert. tib. LLI aileron rot. int. bourse tend. rot.
 TTA LLE (pos. lotus) plateau tib. ext. tête du péroné creux poplité
- Laxité** tiroir ant. positif dans l'axe en rot. ext. en rot. int. arrêt dur arrêt mou
 Lachmann pos. arrêt dur arrêt mou recurvatum test pos. pivot shift positif
 tiroir post. positif batt. lat. int. pos. à 0° à 30° douloureux
 batt. lat. ext. pos. à 0° à 30° douloureux tête péroné mobile
- Tests méniscaux** MacMurray positif douleur localisée à:
 Apley-grinding pos. douleur localisée à:
 Cabot pos.
- Mobilisation contrariée** tend. quadriceps: décollement MI impossible
 tend. ischio-jambier int. déficit fl. solution de continuité
 ext. déficit fl. solution de continuité
 tendon gastrocnemius int. déficit fl. plant. solution continuité
 ext. déficit fl. plant. solution de continuité

-
- ## **Radiographies**
- face profil axial rotule IRM autre

-
- ## **Diagnostic**
- fracture luxation entorse lésion méniscale lésion tendineuse autre

Traitement

- conservateur** bande élastique attelle plâtre décharge durée:
 anticoagulant:
 autre médication:
 incapacité de travail: % du au
- orthopédique** réduction
- chirurgical**